

肝斑注射の説明書・同意書

治療間隔：2～4週間に1回

肝斑注射(トラネキサム酸注射)は、抗炎症作用や美白効果のあるトラネキサム酸を肌に細かく注射する治療です。2～4週間毎に5～6回治療することをお勧めします。

施術前の注意事項

- ・以前トラネキサム酸でアレルギー反応が起こった方は受けられません。
- ・麻酔アレルギーの方は受けられません。
- ・2日以内に発熱や、その他体調不良があった方は受けられません。
- ・基礎疾患がある方は事前に申し出て下さい。
- ・ヘルペスなどの感染症で治療中の方は受けられません。
- ・妊娠または妊娠している可能性がある方は受けられません。

施術中の注意点

- ・麻酔をするため、痛みは感じにくいですがチクチクした軽い痛みがあります。

施術後の注意点

- ・赤みや一時的な腫れ、むくみが出ることがありますが、ほとんどの場合2～3日で治まります。
- ・内出血が出た場合、1～2週間で治まります。
- ・直後は注入部位に凹凸がありますが、ほとんどの場合翌日～数日後には消失します。
- ・まれに治療部位の炎症反応(痛み、かゆみ、圧痛)が起きることがあります。
- ・当日はシャワー、洗顔、入浴、基礎化粧品(化粧水など)は可、メイクは翌日から可能です。
- ・施術部位のマッサージは1週間後から可能です。
- ・当日は血流がよくなること(激しい運動、飲酒、サウナなど)はお控え下さい。

※キャンセルについて

キャンセルはいかなる場合においても必ず前日までにお願いいたします。

当日キャンセルはキャンセル料(3,300円)が発生いたします。

◎私は上記内容及び各施術の説明書についてよく説明を受け、十分に理解しました。よって自分の意志により施術を申し込みます。

私は上記内容を確認し、説明を受けこの施術を行うことに同意いたします。

年 月 日

本人署名(未成年の場合は法定代理人署名)